



Maxforce
QUANTUM



Biozid, Gelköder

Wirkstoff

Imidacloprid 0,3 mg/g (0,03 %)

Inhalt:

30 g

INSEKTIZID

- ✓ **Breit wirksam:** gegen alle Ameisenarten
- ✓ **Hochattraktiv:** Sirupköder
- ✓ **Ausdauernd:** drei Monate wirksam

Gegen Ameisen

Berufliche Verwender



DAC81677891F - ARTICLE 81765375

Bayer



Achtung

Fertigköder (RB)

Wirkstoff: Imidacloprid 0,3 mg/g (0,03 %)

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Menschen und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen.

Notfalltelefon Deutschland: +49 (0) 2 14 30-20 220

Zulassungs-Nr. : (D) DE-0010936-18

(A) AT-0010770-0000

Bayer - Bayer CropScience Deutschland GmbH

Elisabeth-Selbert-Str. 4 a - D-40764 Langenfeld

Tel. +49 (0) 2173 20 76-0

www.environmentalscience.bayer.de

**Achtung: Maxforce® QUANTUM nicht auf elektrische Kontakte bringen.
Kurzschlussgefahr und Gefahr eines Stromschlages!**

Maxforce® QUANTUM ist eine hochattraktive Köderformulierung für die wichtigsten europäischen Ameisenarten. Maxforce® QUANTUM vereinigt die wesentlichen Eigenschaften eines guten Köders: breites Wirkspektrum, hohe Attraktivität, hoher Eintrag in die Kolonie durch verzögerten Wirksamkeitsbeginn und lang anhaltende Wirkung nach Ausbringung. Das Mittel wurde so konzipiert, dass die Bekämpfung der Kolonie im Vordergrund steht. Eine verzögerte Befallstilgung ist somit erwünscht und dient zur Erzielung einer permanenten Problemlösung (Abtötung der Königin und Brut). Bei korrekter Anwendung ist in den meisten Fällen mit einer deutlichen Abnahme des sichtbaren Ameisenbefalls innerhalb von einer Woche zu rechnen. Der Zusammenbruch der Kolonie folgt in der Regel nach 2 – 3 Wochen.

Anwendungsgebiete

Maxforce® QUANTUM wurde speziell für die Bekämpfung der Pharao-Ameise (*Monomorium pharaonis*), Schwarzkopf-Ameise (*Tapinoma melanocephalum*) und der Schwarzen Wegameise (*Lasius niger*) entwickelt, erzielt aber auch gegen andere, nicht genannte Arten einen Behandlungserfolg. Das Mittel ist sowohl zur Anwendung im Innenbereich als auch im Außenbereich geeignet.

Das Mittel ist besonders zur Anwendung in sensiblen Bereichen geeignet, in denen das Ausbringen von Spritzmitteln eingeschränkt oder nicht möglich ist, z. B. in Krankenhäusern und Lebensmittelbetrieben.

Achtung: Maxforce® QUANTUM nicht auf elektrische Kontakte bringen: Kurzschlussgefahr und Gefahr eines Stromschlages!

Wirkungsmechanismus

Der Wirkstoff Imidacloprid koppelt irreversibel (unlösbar) an den postsynaptischen Acetylcholinrezeptor. Damit wird eine Dauererregung der Nerven bzw. Muskeln mit anschließender letaler Erschöpfung erzeugt.

Anwendung

Maxforce® Quantum mit entsprechend geeigneten Kartuschenpistolen wie Bait Gun®, Bait Mate®, Plas Pak Gun® etc. ausbringen. Vor der Behandlung den Befallsgrad und die Befallsstellen ermitteln und die Köderpunkte in unmittelbarer Nähe der Ameisenstrassen platzieren.

Den Köder auf horizontalen, nicht absorptiven Oberflächen ausbringen. Nur für Mensch und Tier unzugängliche Stellen behandeln.

In beködeten Arealen keine anderen Behandlungsmaßnahmen wie Residualsprays durchführen.

Aufwandmenge

1 Köderpunkt mit 1 cm Durchmesser hat ein Gewicht von 200 mg.

Anwendung im Innenbereich gegen Pharao- und Schwarzkopf-Ameisen:

Köderpunkte werden nur in den Bereichen mit höchster Ameisenaktivität ausgebracht. Dieser Behandlungsbereich umfasst typischerweise Küche, WC und Bad. Es wird 1 Köderpunkt (200 mg) pro m² Behandlungsbereich ausgebracht.

Anwendung im Innenbereich gegen Schwarze Wegameisen:

Köderpunkte werden nur in den Bereichen mit höchster Ameisenaktivität ausgebracht, vorzugsweise in der Nähe des Eindringens der Ameisen. Es wird 1 Köderpunkt (200 mg) pro laufendem Meter Ameisenstraße ausgebracht, maximal jedoch 2 g pro Behandlung (10 Köderpunkte).

Anwendung im Außenbereich gegen Schwarze Wegameise:

Der Köder wird direkt in die Nestöffnung eingebracht. 2 g Produkt pro Ameisennest verwenden.

Bei mehreren Nestöffnungen diese Menge auf die Eingänge verteilen.

Die obigen Aufwandmengen sind ausreichend für die meisten Behandlungen. Ist in Ausnahmefällen bei starkem Befall der ausgebrachte Köder von den Ameisen aufgebraucht, der Befall jedoch noch nicht getilgt, muss erneut das Gel an den Köderstellen platziert werden.

Nicht auf heißen, staubigen, feuchten oder verschmutzten Stellen ausbringen.

Maxforce® QUANTUM nicht auf empfindlichen Flächen und Gegenständen wie z. B. auf Marmor, Teppichen, Tapeten etc. anwenden, da Fleckenbildung möglich ist. Die Spritze nach dem Gebrauch reinigen und die Köderkartusche wieder mit der Verschlusskappe verschliessen.

Vorsichtsmaßnahmen

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Nach Hautkontakt Haut mit Seife und warmem Wasser abwaschen. Nach Augenkontakt Kontaktlinsen entfernen und sofort und für mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen. Nach Verschlucken Mund ausspülen und viel Wasser trinken. Bei auftretenden Beschwerden Arzt konsultieren und Verpackung oder Kennzeichnungsetikett vorzeigen.

- Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
- Die Köderstellen sind so zu platzieren, dass Kinder und Haustiere keinen Zugang haben und Nahrungs- und Futtermittel nicht mit dem Köder in Berührung kommen können.
- Der Wirkstoff ist giftig für Fische und Fischnährtiere.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden.
- Wassergefährdungsklasse WGK 1: schwach wassergefährdend; Einstufung gemäß VwVwS, Anhang 4.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für gewerbliche Anwender erhältlich.
- Für Folgen nicht bestimmungsgemäßer und missbräuchlicher Anwendung kann keine Haftung übernommen werden.

Lagerung

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor dem Gefrieren schützen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.

Abfallbeseitigung

Restentleerte Packungen der Wertstoffsammlung zuführen. Produktreste nicht dem Hausmüll begeben, sondern in Originalverpackung bei den entsorgungspflichtigen Körperschaften abliefern. Gegebenenfalls die Stadt- oder Kreisverwaltung um Auskunft bitten.

Abfallschlüssel für das ungebrauchte Produkt

020108 Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten.

Bei Unwirksamkeit des Produktes ist die Zulassungsinhaberin zu informieren.