

1

Auf Anzeichen achten

Anhand der **Menge der Anzeichen**, insbesondere des Mäusekots, lässt sich das Ausmaß des Befalls abschätzen.



Überprüfen Sie neben den Bereichen, die Sie eventuell mit dem Personal am Standort identifiziert haben, auch **Lagerräume, Wasserleitungen, abgehängte Decken, Doppelböden** usw. auf Anzeichen für Mäusebefall:

- Kot
- Uringeruch
- Talgspuren
- Sichtung von Tieren



SPUREN, DIE NICHT VERWECHSELT WERDEN DÜRFEN...



Alter Kot

- Trocken, etwas körnig und weißlich
- Leicht schrumpelig
- Zerfällt zu Staub, wenn man ihn zerdrückt



Frischer Kot

- Leicht glänzend, eher braun
- Homogen
- Reiskornförmig

EXPERTENTIPP

Beseitigen Sie regelmäßig alle Verunreinigungen, um alte Spuren nicht mit neuen zu verwechseln.

3

Optimierung der Fallen



Alle 2 bis 3 Wochen die Fallen kontrollieren

- Ersetzen Sie die **LT®NOTOX-Paste** im Köderhalter und legen Sie **Placebo-Krümel** an das innere Gitter des Köderhalters und in die dafür vorgesehenen Fächer.
- Streichen Sie erneut **Köder auf die Zugangsleiter** und an den **Tunneleingang**.
- Falls Tiere gefangen wurden, **tauschen Sie den Beutel** (Aktivkohle beugeben).

EXPERTENTIPP

Bei einer **Bekämpfung durch Fallen** ist die Anzahl der Fallen im Vergleich zu einer Bekämpfung durch Biozide begrenzt. **In einem Raum, in dem 15 Köderfallen erforderlich wären, können Sie 3 bis 4 CLASH!®-Fallen aufstellen, die Sie regelmäßig neu anordnen.**



Den Standort der CLASH!®-Falle neu beurteilen.

- Wenn weiterhin Anzeichen für akuten Befall zu sehen sind, lassen Sie die Falle am selben Standort stehen, auch wenn seit mehreren Tagen nichts gefangen wurde. Wahrscheinlich sind keine Mäuse in die Falle gegangen, weil kein Köder mehr vorhanden war.
- Wenn **keine frischen Spuren von Befall** sichtbar und auch keine Fänge zu verzeichnen sind, wechseln Sie den Aufstellort:
 - Ein Ort, der bei der ersten Untersuchung identifiziert wurde,
 - Oder ein Ort, an dem Sie Spuren entdeckt haben



AEGIS
BY LIPHATECH

MEHRFACHFALLE
für Mäuse



BEWÄHRTE
PRAKTIKEN

LT® | PCO

L'APPROCHE **GLOBALE**
DU RISQUE NUISIBLES

WIE LASSEN SICH
FALLEN
effizient aufstellen ?

CLASH!®

VON EXPERTEN ENTWICKELT LIPHATECH
FÜR 3D-PROFIS

LIPHATECH
by DSG

Leitfaden erstellt vom Technik- und Entwicklungsdienst von LIPHATECH SAS.

Copyright 2024 LIPHATECH SAS. Kz.: 2024-301

Jede Vervielfältigung, Darstellung oder Nachahmung ohne vorherige Genehmigung von LIPHATECH ist untersagt.

1

Die richtige **Diagnose** ist das Geheimnis!

VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE RICHTIGE DIAGNOSE

Begutachten Sie den Standort in Begleitung einer Person, die ihn gut kennt und Ihnen Auskunft über den **Verlauf des Befalls** geben kann.

Darauf basiert die Suche nach Anzeichen für den Befall, um Nistplätze und Futterwege ausfindig zu machen.

WICHTIGE FRAGEN:



WAMM?

- Seit wann ist der Standort befallen?
- Ist der Befall zeitweise unter Kontrolle oder ist er **immer gleich**? Tritt er **wiederholt** auf?
- Ist er **saisonabhängig**?



WARUM?

- Welche **Maßnahmen** wurden bereits ergriffen? Mit welcher **Wirkung**?
- Hängt dies mit **veränderten Praktiken** oder Aktivitäten zusammen?
- Wurden kürzlich **Bauarbeiten** durchgeführt?



WO?

- Werden die Tiere **von den Mitarbeitern** gesehen oder nur die Schäden bzw. **Spuren**?
- Ist der Befall auf **bestimmte Bereiche** beschränkt oder weitläufig verbreitet?

2

Standort für die CLASH!®-Falle

Damit die CLASH!®-Falle ihre maximale Wirkung erzielt, müssen andere Nahrungsquellen möglichst ausgeschlossen werden.

- Aufgerissene Säcke entfernen
- Verschüttete Lebensmittel regelmäßig entfernen.


Diese systematische **Reinigung** erleichtert auch die **Kontrolle der Bekämpfung**, da alte Spuren beseitigt und **aktuell betroffene Stellen leichter identifiziert** werden.

EXPERTENTIPP

Nach 7/8 Fängen in einer CLASH!®-Falle ist die Population an diesem Ort wahrscheinlich ausgerottet. Es macht dann keinen Sinn, die CLASH!®-Falle dort stehen zu lassen.

Gibt es noch frische Spuren, kann die Falle **an Ort und Stelle bleiben**: Wahrscheinlich befindet sie sich auf dem Weg einer anderen Kolonie zu ihrer Nahrungsquelle.

As close as possible to the mice activity, in a place where it won't disturb the staff, so that the trap is neither moved nor damaged.



MÖGLICHE BETROFFENE ORTE: LAGERHALLEN, WOHNUNGEN, BÜROS ...

In der Nähe des Nistplatzes der Mäuse. Ist dies nicht möglich, dann zwischen den **frischen Befallspuren** und dem Ort, an dem sie ihre **Nahrung** finden, oder auf ihren **Laufwegen**.

VERWENDUNG DER CLASH!®-FALLE



Verteilen Sie eine ausreichende Menge Placebo-Köder, gemäß den Anweisungen in der CLASH!®-Gebrauchsanweisung: auf der Zugangsleiter zur Falle, in den dafür vorgesehenen Fächern und auf dem inneren Gitter der Köderlade. Bei starker Nahrungskonkurrenz können Sie dazulegen, was die Mäuse vor Ort gewöhnlich fressen (Mehl, Kekse, Körner usw.).

Scannen Sie den QR-Code, um die Gebrauchsanweisung der CLASH!®-Falle zu lesen.



Suchen Sie einen geeigneten Ort mit frischen Spuren: Große Mengen an frischem Mäusekot sind ein guter Indikator.

